



Untersuchungsauftrag molekulare Diagnostik: BCR-ABL

Adresse: KMT-Labor, z. Hd. Frau Zeschke, Haus N25, Campus Forschung, 3. OG, Raum 035, UKE, Martinistr. 52, 20246 Hamburg

Untersuchungsmaterial: bei CML MRD-Diagnostik bevorzugt aus peripherem Blut → 2-3 ml in PaxGene-Röhrchen (**bitte spezielle Blutentnahmeröhrchen im KMT-Labor anfordern: Tel. 040 7410-54575**), alternativ, falls kein PaxGene-Röhrchen vorhanden, 10-20 ml EDTA; bei Phi+ALL auch Knochenmark

Versand: möglichst per 24-h-Express Montag bis Donnerstag

Patientendaten:

Name:

Geburtsdatum:

Patientenaufkleber:

Material: o 2-3 ml peripheres Blut (PaxGene)
 o Knochenmark (PaxGene)

o 10-20 ml peripheres Blut (EDTA)
o EDTA-Knochenmark

Diagnose: o CML chronische Phase
 o CML akzelerierte Phase
 o CML Blastenphase
 o V. a. CML

o Phi+ALL
 o e1a2-Transkript
 o b2/3a2-Transkript
o MPS (Ausschluß BCR-ABL)

Datum der Erstdiagnose:/...../.....

Therapie: o vor Therapie
 o HU
 o Imatinib
 o <400 mg/d
 o 400 mg/d
 o 600 mg/d
 o 800 mg/d

o allo SCT → Datum:/...../.....
o DLI → Datum:/...../.....
o Dasatinib
o Nilotinib
o Bosutinib
o Sonstige:

Beginn der aktuellen Therapie (Datum):/...../.....

Anfordernde(r) Arzt/Ärztin (**Stempel**), Tel.-Nr. Durchwahl + Fax-Nr.:

Ansprechpartner molekulare Diagnostik:

Dr. med. Philippe Schafhausen
Tel. 040-7410 57122
schafhausen@uke.de

Dr. med. Ulrike Bacher
Tel. 0171-1790266
u.bacher@uke.de

Ansprechpartner CML-Sprechstunde:

Dr. med. Philippe Schafhausen
Tel. 040-7410 57122
schafhausen@uke.de

Dr. med. Gunhild Keller
Tel. 040-7410 53980
gunhildkeller@hotmail.com

Für Rückfragen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung.